http://vk.com/ege100ballov

examino.ru: Подготовка к ЕГЭ – шпаргалки, новости, советы

АКВАТОРИАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ (МОРЯ, ОКЕАНЫ, ОСТРОВА, ПРОЛИВЫ, ЗАЛИВЫ И Т.Д.)

АДЕНСКИЙ ЗАЛИВ, см. Аравийское море.

АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ, часть Средиземного моря между Апеннинским и Балканским п-овами. Наибольшая глубина — 1230 м, 1; воды летом 24—26 °С, зимой 7—13 °С. Соленость до 38 промилле. Лов сардины, скумбрии, на шельфе добыча нефти и газа.

АЗОВСКОЕ МОРЕ, внутреннее море Атлантического океана, самое мелкое на Земле (15 м). Соединено Керченским проливом с Черным морем. Впадают р. Дон и Кубань. Покрыто льдом 2—3 месяца, летом 1 воды 25—30 °С. В последние годы увеличивается соленость из-за уменьшения стока рек. Лов судака, леща, осетра, судоходство.

АЛЕУТСКИЕ ОСТРОВА, архипелаг из 110 о-вов вулканического происхождения на С. Тихого океана. Около 25 действующих вулканов. Субарктические луга и горные тундры, по берегам птичьи базары. Рыболовство, пушной промысел. США, штат Аляска.

АМУНДСЕНА МОРЕ, окраинное море Тихого океана у берегов Зап. Антарктиды. Наибольшая глубина 585 м, 1; воды ниже О °С, соленость 35 промилле. Круглый год покрыто льдами. Водятся морские млекопитающие и птицы.

АНГОЛЬСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Атлантический океан.

АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА, архипелаг на 3. Атлантического океана, в Вест-Индии. Состоит из Больших Антильских и Малых Антильских о-вов. Б. Антильские включают: о-ва Куба, Гаити, Ямайка, Пуэрто-Рико (с одноименными государствами) и др. М. Антильские включают; Виргинские, Наветренные, Подветренные, Барбадос. О-ва внешней цепи сложены известняками, на остальных встречаются вулканические породы, есть действующие вулканы. Климат тропический, пассатный. Горные тропические леса, саванны, на юж. о-вах — ксерофитные леса и кустарники, плантации. Сев. архипелага расположен глубоководный Пуэрто-Риканский желоб глубиной — 8742 м.

АРАВИЙСКОЕ МОРЕ, полузамкнутое море Индийского океана между п-овами Аравийским и Индостан. Наибольшая глубина 5803 м, крупные заливы Оманский, Аденский. Сообщается с Красным морем Баб-эль-Мандебским проливом (длина 900 км, ширина до 300 км, глубина до 4525 м). t воды 22—29°С, соленость более 36 промилле. Лов тунца, меч-рыбы, судоходство.

АРАФУРСКОЕ МОРЕ, окраинное море Индийского океана между Австралией и Новой Гвинеей. Наибольшая глубина — 3680 м, крупный залив Карпентария, t воды 25—28 °С, соленость 34—35 промилле.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН, расположен большей частью в зап. полушарии, вытянут с С. на Ю. на 16000 км. Площадь 91,56км^2, средняя глубина 3600 м, наибольшая — 8742 м. Омывает Сев. и Юж. Америку, Антарктиду, Африку, Европу. Широко связан со всеми океанами. В сев. полушарии береговая линия сильно расчленена, 13 морей. Через весь океан протянулся Срединно-Атлантический хребет высотой ок. 2000 км, с рифовой долиной шириной от 6 до 30 км. К рифтам приурочены действующие влк. Исландии и Азорских о-вов. Площадь шельфа больше, чем в Тихом океане. На шельфе Северного моря, в Мексиканском, Гвинейском, Бискайском, Венесуэльском заливах — нефть, у Великобритании и Флориды — россыпное олово, алмазы — у Юго-Зал. Африки, фосфориты — у берегов тропической Африки, железомарганцевые конкреции — у Флориды и Ньюфаундленда. Расположен во всех климатических поясах. Наиболее суровы юж. р-ны. Течения: Сев. Пассатное, Гольфстрим, Сев.-Атлантическое (теплые), Канарское (холодное) Юж. Пассатное, Бразильское (теплые). Зап. Ветров, Бенгельское (холодные). Зональность водных масс сильно нарушается течениями и влиянием суши. Соленость выше, чем в других океанах, так как испаряющаяся влага уносится на материки. Температура поверхностных вод ниже, чем в Тихом океане, из-за влияния Арктики. Замерзает не только на юге, но и в мелких опресненных заливах и морях Евразии. Характерно обилие айсбергов и плавучего льда на С. и Ю. Органический мир беднее, чем в Тихом. В шельфовых р-нах много придонных и донных рыб, ресурсы некоторых из них истощены.

БАБ-ЭЛЬ-МАНДЕБСКИЙ ПРОЛИВ, см. Аравийское море.

БАГАМЫ, архипелаг равнинных о-вов на 3. Атлантического океана. Протянулся на 1500 км от п-ова Флорида до о-вов Куба и Гаити. Более 700 коралловых о-вов с тропическим пассатным климатом, бывают ураганы, не хватает пресной воды. Колючие кустарники, вечнозеленые и листопадные леса. Государство Багамские Острова.

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ, внутриматериковое море Атлантического океана. Соединяется с Северным морем Датскими проливами.-Преобладают глубины 40—100 м, наибольшая — 470 м. На С. берега скалистые, фьордового типа, на Ю. — низменные. Береговая линия сильно изрезана, крупные заливы (Рижский, Финский, Ботнический), много о-вов. Впадают р. Нева, Сев. Двина, Неман, Висла, Одра. Зимой t 1—3 °С, в заливах замерзает. Летом — 18—20 °С. Соленость 6—8 промилле. Ветры вызывают повышение уровня воды в заливах до 1,5—3 м, что вызывает наводнения (в Невской губе). Важнейший морской путь, лов кильки, салаки, трески.

БАССОВ ПРОЛИВ, см. Тасмания.

БАФФИНОВА ЗЕМЛЯ, см. Канадский Арктический архипелаг.

БЕЛЛИНСГАУЗЕНА МОРЕ, окраинное море Тихого океана у берегов Зал. Антарктиды. Наибольшая глубина 4115 м, острова Петра I и Александра I. Соленость 33,5 промилле. В течение всего года поверхность занята плавучими льдами и айсбергами.

БЕЛОЕ МОРЕ, внутреннее море Сев. Ледовитого океана между п-овами Кольским и Канинным, соединяется с Баренцевым морем проливами. Наибольшая глубина 350 м, сев.-зап. берега высокие, юго-вост. — пологие. Заливы (губы): Мезенская, Онежская, Двинская и др. о-ва: Соловецкие, Моржовец. Впадает Сев. Двина, Мезень, Онега. I, летом 6—15 °С, зимой ниже О °С, покрыто льдом. Соленость 24—35 промилле. Лов сельди, наваги, сиговых. Связано по рекам и каналам с Балтийским, Каспийским, Азовским, Черным морями.

БЕНГАЛЬСКИЙ ЗАЛИВ, в Индийском океане, расположен между п-овами Индостан и Индокитай. Наибольшая глубина 4519 м. Впадают р. Ганг и Брахмапутра. Соленость 43 промилле. Лов макрели, скумбрии, тунца, камбалы, сбор устриц, трепангов.

БЕНГЕЛЬСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Атлантический океан.

БЕРИНГОВО МОРЕ, полузамкнутое море на С. Тихого океана, между Азией и Сев. Америкой. Отделено от океана Алеутскими и Командорскими о-вами, соединяется с Чукотским морем Беринговым проливом (ширина 86 км, длина 96 км, наименьшая глубина 36 м). Наибольшая глубина 5500 м, берега высокие, скалистые. Крупные заливы: Анадырский (Россия) и Бристольский (США). Крупные о-ва: Карагинский, Прибыло-ва. Св. Лаврентия. Впадают р. Анадырь и Юкон. <; летом 9—10 °С, зимой 5—6 °С, почти весь год покрыто льдами. Лов лососевых, камбалы, сельди, сайры, минтая, промысел котиков и тюленей. На берегах — птичьи базары.

БИСКАЙСКИЙ ЗАЛИВ, в Атлантическом океане, у берегов Европы. Длина 400 км, наибольшая глубина 5100 м, впадают р. Луара и Гаронна. Часты штормы. Лов сардины, анчоуса, устричный промысел.

БОЛЬШОЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ ЗАЛИВ, в Индийском океане, у юж. берега Австралии. Глубина до 5670 м. Крупный о-в — Кенгуру.

БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ, прерывистая гряда коралловых рифов и о-вов длиной 2300 км вдоль сев.-вост. берега Австралии в Коралловом море. Ширина от 2 км до 150 км. Большая часть рифов обнажается во время приливов, есть 20 проходов для судов.

БОСФОР, см. Черное море.

БОФОРТА МОРЕ, окраинное море Сев. Ледовитого океана у берегов США и Канады. Глубина до 3749 м, весь год покрыто льдами. Впадает р. Маккензи.

БРАЗИЛЬСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Атлантический океан.

БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА, группа о-вов в Атлантическом океане, в состав входят крупные о-ва Великобритания, Ирландия, а также Гебридские, Шетлендские и др. Отделены от Европы проливами Ла-Манш (длина 578 км, ширина на 3. 250 км, на В. — 32 км, наименьшая глубина 23,5 м) и Па-де-Кале (вход в Ла-Манш со стороны Северного моря, длина 37 км, ширина 32 км, глубиаа не более 64 м). Государства Великобритания и Ирландия.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, один из Британских о-вов, омывается Северным морем, с 3. — Атлантическим океаном. Берега сильно изрезаны. На С. и 3. преобладают невысокие горы (до 1343 м) с платообразными вершинами и ледниковыми формами рельефа. На Ю. и В. — равнины. Климат умеренный океанический, часты туманы. Густая сеть рек и каналов, на С. много озер. В горах — вересковые пустоши и торфяники, на равнинах — широколиственные леса. Большая часть равнин распахана.

ВОСТОЧНО-АВСТРАЛИЙСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Тихий океан.

ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ, полузамкнутое море Тихого океана, между побережьем Азии и о-вами Рюкю. Наибольшая глубина 2719 м, впадает р. Янцзы, 1; летом 27—28 °С, зимой 7— 16 °С, соленость до 34,6 промилле. Лов сардины, сельди, омаров, крабов.

ВРАНГЕЛЯ ОСТРОВ, в Сев. Ледовитом океане, отделен от Азии проливом Лонга. Сложен метаморфическими породами, в центре — горы с ледниками, по окраинам — равнины с тундрами и озерами. Россия.

ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА, группа из 13 вулканических о-вов в Тихом океане близ экв. Высота до 1707 м, климат пассатный, сухой. Сухие саванны и полупустыни, в горах — влажные тропические леса. Много эндемиков. Провинция Эквадора.

ГИБРАЛТАРСКИЙ ПРОЛИВ, см. Средиземное море.

ГОЛЬФСТРИМ, система теплых течений в сев. части Атлантического океана. Формируется в юж. части Флоридского пролива, в океане соединяется с Антильским течением и движется на С. вдоль Сев. Америки до Ньюфаундлендской банки, после которой называется Сев.-Атлантическим течением. Ширина до 200 км, толщина потока 700—800 м, скорость 10 км/ч.

ГРЕНЛАНДИЯ, крупнейший о-в на Земле, между Атлантическим и Сев. Ледовитым океанами. Более 80% территории покрыто льдами (толщина щита до 4300 м), в прибрежных водах — айсберги. Берега изрезаны фьордами. Климат арктический и субарктический, на берегу — морской, в центре — континентальный. Один из полюсов холода сев. полушария (-70 °С). На побережье — тундры. Рыболовство, овцеводство. Часть территории Дании, пользуется самоуправлением с 1979 г.

ГУДЗОНОВ ЗАЛИВ, в Сев. Ледовитом океане, у берегов Канады. Гудзоновым проливом соединен с Атлантическим океаном. Глубина до 258 м, с октября по июль покрыт льдом. Лов трески, сельди, камбалы, промысел тюленей.

ДАТСКИЕ ПРОЛИВЫ, система проливов между п-овами Скандинавским и Ютландия, соединяет Балтийское и Северное моря. Включает проливы Малый Бельт, Большой Бельт, Зунд, Каттегат, Скагеррак.

ЗАПАДНЫХ ВЕТРОВ ТЕЧЕНИЕ, антарктическое поверхностное течение огибает земной шар между 40 и 55° ю. ш. Протяженность до 30 000 км, ширина до 1000 км. Вызывается господствующими в этих широтах зап. ветрами, t меняется от 12—15 °С на С. до 1—2 °С на Ю. В Атлантике от него ответвляется Бенгельское течение, в Тихом океане — Перуанское, в Индийском — Зап.-Австралийское.

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН, большая часть расположена в юж. полушарии и целиком в вост. полушарии. Площадь 76,17 млн км^2, средняя глубина 3710 м, наибольшая — 7209 м (Зондский желоб). Омывает берега Африки, Антарктиды, Австралии и Евразии. Граничит с Тихим и Атлантическим. Береговая линия расчленена слабо, 8 морей. Среди поднятий дна выделяется срединно-океанический хребет с рифтами, шельф имеет значительную ширину только у азиатских берегов. Нефть и газ — в Персидском заливе, близ западной Индии, у Австралии. На шельфе олово, фосфориты, золото. На дне — железо-марганцевые

конкреции. Большая часть — в экв., субэкв. и тропическом поясах, но юж. часть охватывает высокие широты вплоть до антарктических. Особенность климата — сезонные муссоны в сев. части. Поэтому зима — солнечная и тихая, а лето — штормовое и дождливое. К Ю. от 10° с. ш. господствует пассат. Еще южнее — зап. ветры. Течения в сев. части находятся под влиянием муссонов: летнее Муссонное (теплое) с 3. на В., зимнее — наоборот. В юж. части — Юж. Пассатное течение (теплое) и течение Зап. Ветров (холодное). Вдоль Африки к С. от экватора — Сомалийское (холодное), к югу — Мозамбикское и Мыса Игольного (теплые). Средняя Ъ 17 °С, сильно влияет Антарктика, сев. часть значительно теплее, в Персидском заливе — до 34 °С. В Красном море самая высокая соленость — 42 промилле. Органический мир особенно богат на шельфе и коралловых рифах. Велики скопления ракообразных. В целом слабо изучен и используется недостаточно.

ИРЛАНДИЯ, один из Британских о-вов в Атлантическом океане. Берега сильно изрезаны, преобладает равнинный рельеф с отдельными невысокими горными массивами. Климат умеренный океанический, осадков до 2000 мм в год. Густая речная сеть, много озер и болот. Вересковые пустоши, луга, отдельные рощи. Расположены государства Ирландия и Великобритания (Ольстер).

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ЗАЛИВ, в Тихом океане, у зап. берегов Сев. Америки. Длина 1240 км, глубина до 3292 м. Много о-вов, впадает р. Колорадо. .Лов камбалы, тунца, скумбрии, морского окуня.

КАЛИФОРНИЙСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Тихий океан.

КАНАДСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ АРХИПЕЛАГ, в Сев. Ледовитом океане, на С. Сев. Америки. Баффинова Земля — самый большой остров. О-ва расположены на шельфе. Преобладают холмистые равнины на В. — горы до 2926 м, покровное оледенение. Прибрежные моря 9—10 месяцев покрыты льдами. На С. о-вов — арктические пустыни, на Ю. — тундры. М-ния железной руды, нефти, газа. Государство Канада.

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА, вулканические о-ва в Атлантическом океане в 100 км от Африки. Сложены вулканическими породами, высота до 3718 м, климат тропический пассатный, осадков 300—500 мм в год. Вечнозеленая лесная растительность. Автономная область Испании.

КАНАРСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Атлантический океан.

КАРИБСКОЕ МОРЕ, полузамкнутое море Атлантического океана между Антильскими о-вами и Юж. Америкой. Наибольшая глубина 7090 м, берега гористые, местами с коралловыми рифами, 1, воды 25—27 °С, соленость 36 промилле. Рыболовство, лов жемчужниц. Через К. м. и Панамский канал лежит кратчайший путь из Атлантики в Тихий океан

КАРПЕНТАРИЯ ЗАЛИВ, см. Арафурское море.

КИПР, см. Средиземное море.

КОРАЛЛОВОЕ МОРЕ, полузамкнутое море Тихого океана у берегов Австралии. Проливом Торреса (длина 74 км, ширина 150—240 км, наименьшая глубина 7,4 м) соединяется с Индийским океаном (Арафурское море). Наибольшая глубина 9174 м. Многочисленные коралловые о-ва и рифы. 1; воды от 19 до 28 °С, соленость 35,5 промилле.

КОРСИКА, см. Средиземное море.

КРАСНОЕ МОРЕ, межматериковое море Индийского океана между Африкой и Аравийским п-овом. Соединяется Суэцким каналом со Средиземным морем, с Индийским океаном — Баб-эль-Мандебским проливом. Наибольшая глубина 3039 м, берега изрезаны слабо. Одно из самых теплых (32 °С) и самое соленое (до 42 промилле). Кратчайший морской путь из Европы в Азию и Австралию. Рыболовство, добыча жемчуга.

КРИТ, см. Средиземное море.

КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА, архипелаг вулканических о-вов в Тихом океане, от п-ова Камчатка до о-ва Хоккайдо. С В. протянулся Курило-Камчатский желоб (глубина до 9717 м). Берега обрывистые, о-ва гористы (до 2339 м). 40 действующих вулканов, высокая сейсмичность. Климат умеренный муссонный, много озер. Рыболовство. Принадлежат России.

КУРОСИО, см. Тихий океан.

ЛАБРАДОРСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Атлантический океан.

ЛА-МАНШ, см. Британские острова.

ЛА-ПЛАТА, залив Атлантического океана, у берегов Юж. Америки, эстуарий рек Уругвай и Парана. Длина 320 км, ширина 220 км, глубина 10—20 м.

МАГЕЛЛАНОВ ПРОЛИВ, см. Огненная Земля.

МАДАГАСКАР, остров в Индийском океане, в 400 км от Африки. Обломок Африканской платформы плато с отдельными горными массивами (до 2643 м). Потухшие вулканы, часты землетрясения. М-ния графита, кобальта, берилла, никеля. Климат тропический, на С.-3. — субэкваториальный. Осадков на приморских низменностях более 3000 мм в год, на плато к 3. количество осадков снижается до 400 мм. Густая сеть многоводных рек. На 3. и в центре — разреженные тропические леса, наиболее распространены вторичные саванны, на Ю.-3; — тропическая полупустыня, вдоль зап. побережья мангровые заросли, вдоль вост. — рощи кокосовых пальм. Суверенное государство.

МАЛАЙСКИЙ АРХИПЕЛАГ, самое большое скопление островов на земном шаре между материковой Азией и Австралией. Включает Большие Зондские (Калимантан, Сулавеси, Суматра, Ява), Малые Зондские, Филиппинские, Молуккские и несколько групп более мелких о-вов. Рельеф горный (до 4101 м), более 100 действующих вулканов. Крупнейшие м-ния олова, нефти. Климат субэкв. и экв. Осадков в горах более 5000 мм в год. На крупных островах густая сеть многоводных рек. Преобладают влажные тропические леса, местами муссонные леса и саванны. Флора и фауна отличаются огромным разнообразием. Индонезия, Малайзия, Филиппины и др.

МАРИАНСКИЙ ЖЕЛОБ, см. Тихий океан.

МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ, в Атлантическом океане, между п-овами Флорида и Юкатан. По гидрологическому режиму — полузамкнутое море, глубина до 3822 м. Впадает р. Миссисипи, соединен с Карибским морем Юкатанским проливом. Сток воды из М. з. через Флоридский пролив дает начало Гольфстриму. На шельфе — добыча нефти.

МОЗАМБИКСКИЙ ПРОЛИВ, см. Мадагаскар.

МОЗАМБИКСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Индийский океан.

МУССОННОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Индийский океан.

МЫСА ИГОЛЬНОГО ТЕЧЕНИЕ, см. Индийский океан.

НОВАЯ ГВИНЕЯ, остров на 3. Тихого океана, второй по величине на земном шаре. Длина свыше 2000 км, ширина до 700 км. Горная территория, высота до 5029 м, есть действующие вулканы. Климат экваториальный и субэкваториальный, в горах осадков более 4000 мм в год. Многоводные реки. • Влажные тропические леса, велико разнообразие флоры в фауны. Индонезия и Папуа—Новая Гвинея.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, группа о-вов в юго-зап. части Тихого океана. Включает о-ва Северный, Южный и др. Поверхность гориста (до 3764 м), на С. — действующие вулканы и гейзеры. Часты землетрясения. Климат субтропический морской, на Ю. — умеренный, осадков до 5000 мм в год. Много полноводных рек, озер. Горные леса, кустарники и луга, флора и фауна эндемичны. Суверенное государство.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ, архипелаг в Сев. Ледовитом океане, между Баренцевым и Карским морями. Состоят из двух островов, разделенных проливом Маточкин Шар, и мелких о-вов. Высота до 1547 м, четверть поверхности занята ледяным покровом. Арктические пустыни и тундры. Промысел песца и морского зверя, птичьи базары. Территория России.

НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА, архипелаг в Сев. Ледовитом океане, между морями Лаптевых и Восточно-Сибирским. Состоит из трех групп островов: Анжу, Де-Лонга, собственно Новосибирских. Преобладают многолетнемерзлые горные породы и подземные льды. Арктические тундры, озера и болота. Промысел песца. Россия.

НЬЮФАУНДЛЕНД, о-в в Атлантическом океане, у вост. берегов Сев. Америки. Волнистая равнина, много озер и болот, хвойные леса и тундры. Провинция Канады.

ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ, архипелаг (и самый крупный о-в) у юж. оконечности Юж. Америки. Отделен от материка Магеллановым проливом (длина 575 км, ширина ок. 2,2 км, глубина ок. 20 км). На 3. и Ю. о-ва — горы высотой до 2459 м, ледники, фьорды, листопадно-вечнозеленые леса, на С. и В. — холмистые равнины со степями, лугами, торфяными болотами. Рыболовство и овцеводство. Чили и Аргентина.

ОКЕАНИЯ, так называют около десяти тысяч островов Тихого океана, расположенные в его центр, и юго-зап. части. Самые крупные — арх. Новая Гвинея и Новая Зеландия. К О. относятся о-ва Фиджи, Маршалловы, Гавайские, Тонга и др. Большинство островов — коралловые и вулканические, есть материковые и вершины подводных хребтов. Острова необыкновенно живописны. Главное своеобразие — это малые размеры суши, изолированность и положение в экваториальных и тропических широтах. Почти каждый остров имеет эндемичные виды растений и животных, природные комплексы очень уязвимы. Население принадлежит к экваториальной расе, есть пришлые народы. Земледелие, охота и рыболовство. Государства Вануату, Тонга, Фиджи, часть Индонезии. Многие о-ва — владения Великобритании, Франции, США, Австралии, Чили, Новой Зеландии.

ОХОТСКОЕ МОРЕ, полузамкнутое море у вост. берегов Азии. Проливом Невельского, Татарским, Лаперуза сообщается с Японским морем, Курильским прол. — с Тихим океаном. Наибольшая глубина 3621 м, берега скалистые. Крупные о-ва — Шантарские, 1 воды летом 1,5—15 °С, зимой -1,8—2 °С. Соленость до 33,8 промилле. С октября по июнь покрыто льдом. Лов лососевых, сельди, минтая, наваги, мойвы, крабов.

ПА-ДЕ-КАЛЕ, см. Британские острова.

ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, в Индийском океане, у берегов Юго-Зап. Азии. Обособлен Аравийским п-овом. Через Ормузский пролив и Оманский залив сообщается с Аравийским морем. Длина 926 км, ширина 180—320 км, глубина до 115 м. Много прибрежных о-вов и коралловых рифов. Впадает р. Шатт-эль-Араб. Рыболовство, добыча жемчуга. На дне и в прилегающих р-нах — обширные запасы нефти.

ПЕРУАНСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Тихий океан.

РОССА МОРЕ, окраинное море Тихого океана у берегов Антарктиды. Наибольшая глубина 2982 м, юж. часть покрыта шельфовым ледником Росса, сев. — круглый год плавучими льдами и айсбергами, 1; воды не превышает 2 °С, соленость до 34,4 промилле. Морские млекопитающие.

САРДИНИЯ, см. Средиземное море.

САХАЛИН, остров у вост. берегов Азии, омывается Японским и Охотским морями. Длина 948 км, ширина до 100 км. Берега слабо изрезаны. Вдоль берегов — горы до 1609 м, в центре — равнины. Климат умеренный муссонный, в горах до 1200 мм осадков в год, на равнинах — до 600 мм. Главные р. Тымь и Поронай, много озер и болот. Редкостойная лиственничная тайга и леса из сахалинской пихты, на Ю.-3. — широколиственные леса с лианами, с подлеском из бамбука. В горах — заросли каменной березы и кедрового стланика. Птичьи базары, лежбища морского зверя. Россия.

СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ, архипелаг в Сев. Ледовитом океане, разделяет море Лаптевых и Кар ское. Отделен от п-ова Таймыр проливом Вилькицкого (длина 104 км, ширина 55 км, наименьшая глубина 82 м, плавучие льды). Крупные о-ва: Октябрьской Революции, Большевик, Комсомолец, Пионер. Берега скалисты и обрывисты. Состав горных пород и рельеф разнообразен, треть территории покрыта ледниками. Климат арктический, преобладают арктические пустыни с пятнами мохово-лишайниковой растительности. Лежбища нерпы, гренландского тюленя, моржа, белухи. Россия.

СЕВЕРНОЕ МОРЕ, окраинное море Атлантического океана у берегов Европы. Соединяется с Балтийским морем Датскими проливами, с океаном — проливами Па-де-Кале и Ла-Манш. Более трети моря имеет глубину менее 100 м, наибольшая глубина 725 м, в юж. части много отмелей. Значительный о-в — Гельголанд. Впадают реки Эльба, Везер, Рейн, Темза. Зимой 1 воды 2—7 °С, летом 12—19 °С, соленость 31— 35 промилле. Льды по берегам с декабря по. март, часты туманы, приливы увеличиваются ветрами до 3 м, могут вызывать наводнения на берегах. Лов сельди, трески, тунцовых, камбаловых, добыча нефти и газа.

СЕВЕРНОЕ ПАССАТНОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Тихий океан и Атлантический океан.

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН, наименьший из океанов Земли. Площадь —• 14,75 млн км^2, расположен в сев. полярных широтах и со всех сторон окружен сушей — Евразией и С. Америкой. С Атлантикой граничит по 62° с. ш. Средняя глубина — 1220 м, наибольшая — желоб Литке (5449 м). Береговая линия сильно расчленена, 9 морей. Много островов и архипелагов. Около половины площади занимает шельф. Главный элемент рельефа — продолжение Срединно-Атлантического хребта — хребет Гаккеля. Известно более 50 месторождений нефти и газа, рассыпные месторождения металлов. Климат определяется полярным положением. Летом ок. О °С, зимой до -40 °С, осадков — 100—200 мм, формируются арктические воздушные массы. Под воздействием зап. ветров из Атлантики входит и движется на В. поток теплых вод, от Чукотского моря воды движутся в зап. направлении, образуя Трансарктическое течение. Характерная особенность — круглогодичное существование льда. Вода большую часть года близка к точке замерзания при данной солености, только в субарктике она повышается до 4—5 °С. Основную биомассу образуют холодноводные водоросли, в приатлантических р-нах, промысловые рыбы. Па льдах вблизи островов и побережий встречаются белые медведи, тюлени, моржи.

СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Атлантический океан.

СЕВЕРО-ТИХООКЕАНСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Тихий океан.

СИЦИЛИЯ, см. Средиземное море.

СОМАЛИЙСКОЕ ТЕЧЕНИЕ,см. Индийский океан.

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ, межматериковое море Атлантического океана между Европой и Африкой. Гибралтарским проливом (длина 59 км, ширина 14—44 км, наименьшая глубина 53 м) соединяется с океаном, через пролив Дарданеллы (длина 120 км, ширина 1,3—27 км, глубина 29— 153 м). Мраморное море (глубина до 1273 м) и пролив Босфор — с Черным морем, через Суэцкий канал — с Красным морем. Наибольшая глубина 5121 м. В сев. части выделяют обособленные о-вами и п-овами моря: Альборан, Балеарское, Лигуряйское, Тирренское, Адриатическое, Ионическое, Эгейское и Кипрское. Крупные о-ва: Балеарские (Испания), Корсика (Франция), Сардиния, Сицилия (Италия), Крит (Греция) и Кипр (суверенное государство). Впадают реки Нил, По, Рона, Эбро. Зимой Ъ воды 12—17 °С, летом — от 19 до 27—30 "С. Соленость от 36 промилле. Лов тунца, макрели, скумбрии, добыча нефти на шельфе, важнейшие морские пути, курорты.

ТАЙВАНЬ, о-в у юго-вост. побережья Азии, отделен от материка Тайваньским проливом. По оси Т. протянулись горы (3550 м), на 3. — низменность, берега изрезаны слабо. Климат муссонный, осадков 1500—5000 мм в год, часты тайфуны. Тропические леса, выше 3000 м — кустарники и луга. Провинция Китая.

ТАСМАНИЯ, о-в у юго-вост. побережья Австралии. Отделен от материка проливом Басса (ширина 213 км, длина 490 км, наименьшая глубина 51 м). Берега скалистые и крутые. Внутр. части о-ва — плато, покрытые лесами из эвкалиптов, миртового дерева и высокотравными лугами. Штат Австралии.

ТАСМАНОВО МОРЕ, окраинное море Тихого океана между Австралией, о-вами Тасмания, Новая Зеландия. Глубина до 6015 м. Зимой Ъ 27—14 °С, летом 23—9 °С (с С. на Ю.). Соленость 35 промилле, высокие приливы. Лов тунца, ставриды, скумбрии, сайры. ТИМОРСКОЕ МОРЕ, окраинное море Индийского океана между о-вом Тимор и Австралией. Наибольшая глубина 3310 м, больше половины моря мельче 100 м, 1 25—29 "С, соленость 34— 35 промилле.

ТИХИЙ ОКЕАН, расположен во всех полушариях, площадь — 178,62 млн км^2, самый глубокий (в среднем 3980 м). Ограничен Евразией, Австралией, Антарктидой, Сев. и Юж. Америкой. Береговая линия сильно расчленена на западе и спрямлена у американских берегов. Тысячи архипелагов и островов (см. Океания), 12 морей. Значительная часть лежит на одной литосферной плите. По границам сейсмические пояса. Шельф невелик, по окраинам 25 глубоководных желобов (Марианский — 11022 м, наибольшая глубина Мирового океана). Вост.-Тихо-океанское поднятие, из системы срединно-океанических хребтов. Минеральные ресурсы: железомарганцевые конкреции на дне, на американском и азиатском шельфах — нефть, в устьях рек — россыпные м-ния цветных и драгоценных металлов, в зоне подъема глубинных вод у тропических берегов Юж. Америки — фосфориты. Расположен во всех климатических поясах. В р-не экватора весь год 16—24 °С, у Антарктиды 0°С. В тропиках господствуют пассаты, в умеренных широтах — зап. ветры, у берегов Евразии — муссоны. Много осадков в зап. части экваториального пояса (3000 мм), в вост. около 100 мм. Течения образуют два кольца: сев. — Сев. Пассатное, Куросио, Сев.-Тихоокеанское (теплые), Калифорнийское (холодное) — по часовой стрелке и южн. — Южн. Пассатное, Вост. — Австралийское (теплые), течение Зап. ветров, Перуанское (холодные) — против часовой стрелки. Образуются все типы водных масс, кроме арктических. Соленость вод меньше, чем в Атлантическом океане. У Антарктиды замерзает, айсберги доходят до 40-х широт. По числу видов и биомассе самый богатый. Фауна древняя. Наиболее богаты воды коралловых рифов в экв. и тропических широтах. На С. — лососевые рыбы. Главные р-ны промысла — умеренные широты, где происходит интенсивное перемешивание вод, обогащение их кислородом, и шельфы.

ТОРРЕСА ПРОЛИВ, см. Коралловое море.

УЭДДЕЛЛА МОРЕ, окраинное море Атлантического океана у берегов Зал. Антарктиды. Глубина до 6820 м, большую часть года покрыто плавучими льдами и айсбергами, у берегов — шельфовые льды. Водятся киты и тюлени.

ФИЛИППИНСКИЕ ОСТРОВА, архипелаг в зап. части Тихого океана. Свыше 7000 горных о-вов, 10 действующих вулканов. Климат тропический муссонный. Осадков на зап. склонах до 4000 мм в год. Часты тайфуны. Реки короткие, бурные. Почти половина территории покрыта вечнозелеными, листопадными и хвойными лесами. Выше 1200 м — кустарники и луга. Государство Филиппины.

ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА, архипелаг в юго-зал. части Атлантического океана. Состоит из двух больших о-вов и нескольких маленьких и скал (высота до 706 м). Климат океанический, прохладный, осадков 600—700 мм в год. Злаковые луга и пустоши. Рыболовство и промысел морского зверя. Колония Великобритании, спорная территория с Аргентиной.

ЧЕРНОЕ МОРЕ, внутриматериковое море Атлантического океана Керченским проливом соединяется с Азовским морем, через пролив Босфор (длина 30 км, ширина до 3,8 км, наименьшая глубина 20 м, пересечен автомобильным мостом) — с Мраморным морем и далее через пролив Дарданеллы с Эгейским и Средиземным морями. Наибольшая глубина 2210 м. На 3. и С.-3. берега низкие, на В. и Ю. подступают горы. Берега слабо изрезаны, островов мало. Впадают реки Дунай, Днестр, Юж. Буг, Днепр, Рио-ни и др. \, воды зимой 6—8 °С, летом — более 25 °С. Соленость около 18 промилле. На С. в заливах замерзает. На глубине 150 м вода содержит сероводород, поэтому на больших глубинах нет живых организмов. Лов хамсы, ставриды, скумбрии, шпрот и осетровых.

ЮЖНОЕ ПАССАТНОЕ ТЕЧЕНИЕ, см. Тихий. океан. Атлантический океан. Индийский океан.

ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА, зап. часть Тихого океана. Крупные о-ва: Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку, множество мелких. Свыше 3/4 территории — горы. Много действующих вулканов (Фудзияма — высшая точка, 3776 м), часты землетрясения, на побережье Тихого океана — цунами. Климат муссонный, в основном субтропический, На С. — умеренный, на Ю. — тропический. Осадков 1700—2000 мм, на Ю. -— более 4000 мм в год. На С. — продолжительный снежный покров. Обычны тайфуны. Много коротких многоводных рек. На Хоккайдо — хвойные ле са, южнее — вечнозеленые субтропические и тропические. Япония. ЯПОНСКОЕ МОРЕ, полузамкнутое море Тихого океана, между Азией и Японскими о-вами. Соединяется с Охотским морем проливами Татарским, Невельского и Лаперуза, с Тихим океаном — проливом Цугару, с Восточно-Китайским и Желтым морями — Корейским проливом. Наибольшая глубина — 3720 м, 1 воды меняется зимой с С. на Ю. от 0 до 12 °С (замерзает на С.), летом — от 17 до 26 °С. Соленость от 27 до 34 промилле. Рыболовство, промысел крабов, трепангов.